

Esquema de Vacunación				
Edad		Vacuna	Enfermedad que Previene	Aplicación
A partir de los 2 meses	Pentavalente	Difteria, tosferina y tetanos (DPT)	Difteria, tosferina y tetanos (DPT)	Intramuscular
		Haepphilus Influenzae tipo B	Mningitis y otras causadas por	
		Hepatitis B	Hepatitis B	
		Vacuna de Polio via oral	Poliomielitis	Oral
A partir de los 4 meses	Pentavalente	Difteria, tosferina y tetanos (DPT)	Difteria, tosferina y tetanos (DPT)	Intramuscular
		Haepphilus Influenzae tipo B	Mningitis y otras causadas por	
		Hepatitis B	Hepatitis B	
		Vacuna de Polio via oral	Poliomielitis	Oral
A partir de los 6 meses	Pentavalente	Difteria, tosferina y tetanos (DPT)	Difteria, tosferina y tetanos (DPT)	Intramuscular
		Haepphilus Influenzae tipo B	Mningitis y otras causadas por	
		Hepatitis B	Hepatitis B	
		Vacuna de Polio via oral	Poliomielitis	Oral
De los 6 a los 23 meses		Influenza Estacional	Influenza	Subcutanea intramuscular
A año		Triple viral (Sarampion, Rubeola y Paperas)	Sarampion, Rubeola y Paperas	Subcutanea
		Fiebre Amarilla	Fiebre Amarilla	Subcutanea
Al año de las terceras dosis		Difteria, tosferina y tetanos (DPT)	Difteria, tosferina y tetanos (DPT)	Intramuscular
		Vacuna de Polio via oral	Poliomielitis	Oral
5 Años de edad		Difteria, tosferina y tetanos (DPT)	Difteria, tosferina y tetanos (DPT)	Intramuscular
		Vacuna de Polio via oral	Poliomielitis	Oral
		Triple viral (Sarampion, Rubeola y Paperas)	Sarampion, Rubeola y Paperas	Subcutanea
Mujeres en Edad Fertil (10 años)		Toxoide Tetanico Difterico del adulto	Difteria y tetanos neonatal	Intramuscular
Mujeres en Postparto y		Sarampiòn y Rubeola	Sarampion, Rubeola y Síndrome de reubeola	Subcutanea
A los 10 años de la primera dosis		Fiebre Amarilla	Fiebre Amarilla	Subcutanea